Feeder du Hainaut (2)

Séance d'information aux citoyens
Braine-le-Château 24 mars 2025

Sommaire

- Les PFAS
- Normes dans l'eau
- Feeder du Hainaut

  ➔ ISSeP: présentation du projet
- **Recommandations**

Recommandations

- **Eaux de boisson**







- **Alimentation = voie principale de contamination aux PFAS**

A consommer de manière raisonnable :



Alimentation locale -> Risque de contamination si le sol des jardins est pollué



Ok sauf si sol très contaminé



Important : varier les types et les sources d'alimentation

Validé par le CSI

Recommandations

➢ En cuisine :



Eviter les aliments dans des emballages « anti-graisse »



Eviter poêles et casseroles « antiadhésives »


➢ Pour l'entretien et le ménage :




Eviter les produits « résistants aux taches » ou « à l'eau »



Laver régulièrement les surfaces à l'eau



Utiliser des sprays de protection, des produits d'étanchéité, des cires, etc. dans des espaces ventilés




Laver les vêtements neufs avant de les porter

➢ Hygiène :



Eviter les produits portant les mentions « fluor » , « perfluoro » ou « waterproof »

!! le **fluorure** contenu dans le dentifrice n'est pas un PFAS !!



Validé par le CSI

Dispositifs de soutien

107

7j/7 24h/24

trouverdusoutien.be

1718 Appel gratuit


Option 5

A disposition des **citoyens** des zones concernées

0474/128.308

(répondeur)

Merci de votre attention




Enquêtes environnementales

- Novembre 2023:
  - Définition de la ZIP d'Obourg
  - **Phase 1 – Eaux**
    - 13 eaux de surface
    - 20 eaux souterraines
    - 4 rejets

  Pas d'impact significatif des activités via les eaux de surface
  - **Phase 2 – Sols**
    - 20 prélèvements sols
    - Etudes d'orientation en cours chez 3 acteurs.
    - Analyse de dépôts

  Contamination des sols. Etude en cours.



NORMES EN WALLONIE – SANTE (CONSEIL SCIENTIFIQUE INDEPENDANT)

- Index NAS (PFOA + PFOS + PFHxS + PFDA + PFUnDA + MeFOSAA + PFNA)
- Dosage dans le sérum
  - < 2 µg/l — Pas de surveillance particulière
  - 2 à 20 µg/l — Réduire l'exposition
    Attention au profil lipidique, à l'hypertension pendant la grossesse, au cancer du sein.
  - > 20 µg/l — Réduire l'exposition
    Attention au profil lipidique, à l'hypertension pendant la grossesse, au cancer du sein, au taux de TSH, au cancer testiculaire et aux colites ulcéreuses.
- Pas de relation dose-niveau de risque
- Le médecin généraliste est le meilleur conseiller